

## LASTNOSTI

HOKOEX se uporablja za zatiranje mušjih ličink hiške muhe (*Musca domestica*), hlevske muhe (*Stomoxys calcitrans*) in male hišne muhe (*Fannia canicularis*), v hlevih, stajah, v gnoju, na gnojiščih, v nastilju, v jamah z gnojevko... Vsebuje zatiralec rasti, ki učinkuje specifično na vse mušje ličinke, ne vpliva pa na odrasle osebe.

## SESTAVA

Vodotopen granulat: 20 g/kg ciromazin-a (2%)

## NAČIN UPORABE IN DOZIRANJE

Doziranje je vedno 250 g HOKOEX-a na 10 m<sup>2</sup> površine. Način uporabe je odvisen od vsebnosti vode v materialu, ki ga obdelujemo. Možnosti uporabe so naslednje:

- posipanje granulata neposredno na površino (250 g na 10m<sup>2</sup>),
- skropljenje (250 g granulata raztopimo v 1 do 4 L vode in poškopimo po 10 m<sup>2</sup> površine),
- polivanje (250g granulata raztopimo v 4 do 10 L vode in polijemo po 10m<sup>2</sup> površine).

Zatiranje ličink je možno tudi v naseljenih hlevih. Tretiranje ponavljamo vsakih 6 tednov oz. čim je zadnja obdelana plast pokrita za 10 cm.

Pri uporabi HOKOEX-a je treba preprečiti neposreden stik izdelka z živalmi, kontaminacijo krme, krmilniki, napajalniki in molznimi napravami.

## PRIMERI UPORABE

HOKOEX se nanaša povsod tam, kjer se lahko razvijejo mušje ličinke.:

- v hlevih za govedo, prašiče, konje: granulata nizko posipamo. Ob stenah in robovih, pod inštalacijami itd. obdelamo z kanglo za zalivanje ali hrbtno brizgalko. Na tekoči gnoj posipamo direktno. Prvič ličinke zatiramo približno 1 do 3 dni po odstranitvi gnoja.
- V hlevih za govedo z rešetkami tla enakomerno posipamo z HOKOEX-om.
- V hlevih za prašiče: če so tla popolnoma rešetkasta je priporočljiva obdelava celotne površine, če so tla delno rešetkasta obdelamo celotno površino rešetk in tudi območja ležišč. Priporočljiva je obdelava površin pred vhlevljenjem oz. po odstranjevanju gnoja ali izpraznitvi gnojne jame.
- V hlevih za perutnino pri suhem nastilju pršimo s kanglo za zalivanje ali s tlačno brizgalko. Pri mokrem nastilju ali gnoju tretiramo s posipanjem granulata. Celotno površino gnoja obdelamo približno teden dni po vselitvi in še preden je plast gnoja debela 10 cm.

5 kg




# HokoEx®

## LARVACID

### za zatiranje mušjih ličink Vodotopen granulat



25 g/m<sup>2</sup>



## VARNOSTNA OPOZORILA

Hraniti zaprti in otrokom nedosegljivo. Hraniti ločeno od živil, pijače in krme. Med delom ne jejte, ne pijte in ne kadite. Nosite primerne zaščitne rokavice (iz neoprena, butila, nitrila ali naravnega kavčuka). Rokavice iz polivinilnega alkohola niso primene. Deklarirani čas uporabe rokavic mora biti daljši od časa, ki ga potrebujete za manipulacijo z izdelkom.

Preprečiti stik z očmi in kožo. Pri dotiku s kožo ali z očmi izpirati z obilo vode. Pri nesreči ali slabem počutju takoj poiskati zdravniško pomoč.

Opozarjamo na možnost poškodb živali zaradi vznemirjenja ob nanosu produkta, zlasti v prostih rejah.

Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o izdelku!

Pri zaužitju pokličite zdravnika ali 112.

## OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Uporabnik je nosilec tveganja za škodo, ki nastanejo zaradi okoliščin, na katere proizvajalec nima vpliva. Proizvajalec odklanja vsako odgovornost za škodo, ki nastane zaradi nestrokovnega skladiščenja ali uporabe izdelka.

## ODSTRANJEVANJE

Ostanke izdelka je treba porabiti v skladu z navedenimi priporočili za uporabo. Izdelek ne sodi v gospodinjinski odpad.

Embalaza in preostalo vsebino odstranite kot nevarni odpadke. Za odstranitev embalaže in preostale vsebine je odgovoren lastnik odpadka.



HOKO Sarl 15, Ave. de Joinville  
FR-94130 Nogent-sur-Marne  
Tel.: +33-9-70.40.31.88  
Fax: +33-8-26.33.57.31

Hokochemie GmbH  
Pannerhofstr. 7, CH-6353 Weggis  
Tel.: +41-41-390 31 88  
Fax: +41-41-390 31 89

www.hoko.com

Hokoex, Hoko in znak OKO so registrirane blagovne znamke last Hokochemie GmbH, Weggis, Švica.

Za številko serije in datum proizvodnje glejte ločen napis na posodi izdelka.

Rok trajanja: 5 let od datuma proizvodnje.

N.º 045209-00-01