

Zaščitite vaše živali in povečajte vaše donose



## KENO™ COX

### Manjkajoči člen pri zatiranju kokcidioze!

- Zelo učinkovit na večino odpornih oblik oocist: deluje na sporulirane oblike
- Edinstvena sestava brez fenolov, prijavljen patent (PCT/EP2009/000789)

**CID LINES**  
innovative hygiene solutions  
[www.cidlines.com](http://www.cidlines.com)




### Paket popolne biološke zaščite

KENO™ COX je del Paketa popolne biološke zaščite (Bioprotection Box) CID LINES, programa za zagotavljanje varnosti prehranske verige in povečanje donosov na kmetiji.

## Manjkajoči člen pri zatiranju kokcidioze!

Za preventivo in zdravljenje kokcidioze je na voljo nekaj zdravil. Kokcidiostatike dajemo v krmo ali v vodo, da preprečimo akutne izbruhe bolezni in ekonomsko škodo, ki je pogosto povezana s subakutnimi infekcijami. Prednost ima vedno preventiva, ker večino škode nastane preden se pojavijo klinični znaki.

### ŽIVLJENSKI CIKEL OOCIST



Glavni cilj razkuževanje je prekinitev oro-fekalnega prenosa (ubijemo eksogeno obliko), medtem ko aktikokcidiki delujejo le na endogeni stadij. Pravilno čiščenje in razkuževanje sta dodatni ukrep v boju proti kokcidiozi.

## Kaj je KENO™ COX?

KENO™ COX je širokospektralno razkužilo učinkovito proti endoparazitom (npr. *Eimeria spp.*, *Cryptosporidium parvum*) in bakterijam.

KENO™ COX pomaga znižati infekcijski pritisk v objektih za živali. Lahko ga apliciramo na vse vrste površin.

KENO™ COX ima edinstveno sestavo, ne vsebuje fenolov, je varen za uporabnika in za živali.

## Kako uporabljamo KENO™ COX?

ciljna vrsta	koncentracija in kontaktni čas	pogostost uporabe
<i>Eimeria spp</i> <i>Coccidia sp</i>	4% (1:25), 2h	med turnusi

Uporabljajte samo ob pojavu endoparazitov.

1. Predhodno objekte očistite in razkužite. Uporabite alkalno čistilno sredstvo (Biogel, Kenosan).
2. Pustite, da se posuši.
3. Raztopite KENO™ COX v vodi, tako da dobite homogeno raztopino. Doziranje: 4% (=40ml KENO™ COX-a na 1L vode)
4. Obilno razpršite po vseh površinah s 4% raztopino KENO™ COX-a dokler površine niso mokre (0.4L raztopine/m<sup>2</sup>). Ne pozabite na razpoke in luknje v tleh in stenah. Pršite po vseh površinah, ki lahko pridejo v stik z živalmi. Namenite posebno pozornost krmilnikom in napajalnikom.
5. Zaprite vrata in dovolite, da je proizvod v kontaktu s površinami vsaj 2 uri.



'Biocid uporabljate varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu.'



Vaš dobavitelj:

**ANIMALIS**, prehrana in zdravje živali, d.o.o.  
Tržaška cesta 135, SI-1000 Ljubljana  
t./f.: 01 2425 530, m: 031 659804, 040 304180  
e: info@animalis.si www.animalis.si

**CID LINES**  
innovative hygiene solutions

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper • Belgium  
T +32(0)57 21 78 77 • F +32(0)57 21 78 79  
info@cidlines.com • www.cidlines.com