

ANIMEDAZON

2,45 % w/w dermalno pršilo,
suspenzija za govedo, ovce in prašiče

Kakovostna in količinska sestava

Vsak vsebnik za pršilo vsebuje: Zdravilna učinkovina: Klortetraciklinjev klorid 3,210 g (kar ustreza 2,45 % w/w) (kar ustreza 2,983 g klortetraciklina). Pomožna(pomožne) snov(i): Patent Blue V 85 % (E 131): 0,23 g; Izobutan (potisni plin) 92,2 g.

Ciljne živalske vrste

Govedo, ovce in prašiči

Indikacije za uporabo pri ciljnih živalskih vrstah

Zdravljenje površinskih travmatskih ali kirurških ran, okuženih s povzročitelji, občutljivimi na klortetraciklin. Zdravilo se lahko uporablja kot del zdravljenja površinskih okužb kože in parkljev, zlasti dermatitisa interdigitalisa in dermatitisa digitalisa, ki jih povzročajo mikroorganizmi, občutljivi na klortetraciklin.

Kontraindikacije

Ne uporabite v primeru preobčutljivosti na tetracikline. Ne uporabite v primeru znane odpornosti na tetracikline.

Posebna opozorila

Jih ni.

Posebni previdnostni ukrepi

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih: Oči živali zaščitite, ko pršite v bližini glave. Prizadeto mesto pred pršenjem temeljito očistite. Uporaba zdravila mora temeljiti na testiranju občutljivosti, ob tem pa je treba upoštevati uradno in lokalno antimikrobno politiko. Žival je treba odvrtiti od lizanja zdravljenih predelov na sebi ali zdravljenih predelov druge živali. Po dajanju na parkelj mora žival vsaj eno uro stati na suhih tleh.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo: Izogniti se je treba neposrednemu stiku s kožo, saj se lahko pojavijo desenzibilizacija, kontaktni dermatitis in možne preobčutljivostne reakcije na klortetraciklin. Med rokovanjem s tem zdravilom nosite ustrezne nepremočljive rokavice. To zdravilo lahko povzroči močno draženje oči. Zaščitite oči in obraz. Pri stiku s kožo ali očmi prizadeti predel nemudoma izperajte s čisto svežo vodo. Če draženje ne preneha, poiščite

zdravniško pomoč. Ne vdihavajte hlapov. Zdravilo nanašajte na odprtem ali v dobro prezračenem prostoru. V primeru nenamernega zaužitja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite ovojnino. Med dajanjem zdravila ne jejte in ne kadite. Po uporabi si umijte roke. *Druga opozorila:* Obarvan del prašičje kože je treba odstraniti, preden se preostala žival uporabi za prehrano ljudi.

Neželeni učinki (pogostost in resnost)

Redko se lahko pojavijo preobčutljivostne reakcije.

Uporaba v obdobju brejosti in laktacije

Po dermalnem dajanju zdravila za uporabo v veterinarski medicini je absorpcija klortetraciklina zanemarljiva. Zato je zdravilo varno v obdobju brejosti in laktacije.

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Ni podatkov o medsebojnem delovanju z drugimi zdravili. Po dermalnem dajanju pršila klortetraciklina je absorpcija klortetraciklina zanemarljiva. Zato se medsebojno delovanje ne pričakuje.

Odmerjanje in pot uporabe

Dermalna uporaba. Pred pršenjem vsebnik dobro pretresite. Vsebnik držite v razdalji 15 do 20 cm od predela, ki ga želite popršiti; pršite 3 sekunde, dokler ni zdravljen predel enakomerno obarvan. V primeru okužbe parklja je treba to zdravljenje po 30 sekundah ponoviti. Za zdravljenje površinskih ran, okuženih s povzročitelji, občutljivimi na klortetraciklin, se priporoča enkratno dajanje. Za zdravljenje dermatitisa digitalisa se priporočata dvakratno dajanje s 30-sekundnim časovnim intervalom, 3 dni zapored, enkrat ali dvakrat na dan. Za zdravljenje drugih okužb parkljev (dermatitisa interdigitalisa) sta priporočljivi 2 aplikaciji v 30-sekundnem intervalu, enkrat ali dvakrat na dan. Glede na resnost poškodbe in hitrost izboljšanja je treba zdravljenje ponoviti po 1 do 3 dneh.

Preveliko odmerjanje (simptomi, nujni ukrepi, protistrupi) (če je potrebno)
Ni smiselno.



Karenca

Meso in organi: nič dni
Mleko: nič dni
Ne uporabljajte na vimenu pri živalih v obdobju laktacije, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

Inkompatibilnosti

Niso znane.

Rok uporabnosti

Rok uporabnosti zdravila v pakiranju za prodajo: 3 leta

Posebna navodila za shranjevanje

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C. Ne shranjujte v hladilniku ali zamrzovalniku. Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: pri segrevanju lahko eksplodira. Zaščitite pred sončno svetlobo. Hranite pri temperaturi do 50 °C. Hranite ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin.– Ne kadite. Ne pršite proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne prelučnjajte ali sežigajte vsebnika niti, ko je prazen.

Vrsta ovojnine in vsebina

1 vsebnik za pršilo
Kartonasta škatla z 12 x 1 vsebnikom za pršilo
Zdravilo je napolnjeno v 211-ml vsebniku pod tlakom, izdelanem iz nepremazane kositrne pločevine s plastičnim ventilnim mehanizmom in pršilno šobo.

Imetnik dovoljenja za promet

aniMedica GmbH
Im Südfeld 9
48308 Senden-Bösensell
Nemčija

Številka dovoljenja za promet: MR/V/0510/001

Samo za živali. **Rp-Vet.**

Pred uporabo vedno preberite navodila za uporabo.

Datum priprave informacij: 23.9.2022
SAMO ZA STROKOVNO JAVNOST!

Zastopa in prodaja:

ANIMALIS, prehrana in zdravje živali, d.o.o.
Tržaška cesta 135 | 1000 Ljubljana
t. 01 242 55 30 | m. 031 659 804
info@animalis.si | www.animalis.si

LIVISTO PRŠILA

Vrhunska zaščita

POMOČ PRI HITREJŠEM
CELJENJU POVRŠINSKIH
POŠKODB

PROTEGO

Puder v pršilu, ki pomirja in ščiti manjše rane ter razdraženo kožo. Vsebuje sestavine, ki imajo naravne antibakterijske, antiseptične in protiglivične lastnosti. Dodatek origanovega olja mu daje aromatično komponento, ki pomaga odganjati muhe.

Sestava: cinkov oksid, kalcijev stearat, origanovo olje, olje kamilice, olje arnike, olje čajevca, olje ognjiča

Klasifikacija: GSL
Velikost: 200 ml



UPORABA PRI VELIKIH ŽIVALIH:

- Vsaka manjša poškodba kože (ugrizi, odrgnine, ureznine)
- Po odstranjevanje rogov
- Izpuščaj na vimenu
- V pomoč pri zmanjšanju uporabe antibiotičnih pršil



UPORABA PRI MALIH ŽIVALIH:

- Vsaka manjša poškodba kože (ugrizi, odrgnine, ureznine)
- Hot spot - akutni vlažni dermatitis
- Interdigitalno draženje
- Izpuščaj po striženju
- Miaza



ALUMINIUM SPRAY

Vodoodporno topikalno pršilo za rane, ki ustvari zaščitno in zračno bariero ter je enostavno za uporabo.

Kožo zaščiti s tankim kovinskim, prožnim filmom, ki ji omogoča, da diha, hkrati pa tvori zaščito pred kontaminacijo in drugimi zunanjimi dražljivimi dejavniki.

Sestava: Koloidni aluminij 4,0 % m/m

Klasifikacija: GSL
Velikost: 200 ml



UPORABA PRI KONJIH:

- Kastracijske rane
- Kirurške rane
- Majhne ureznine in odrgnine



UPORABA PRI VELIKIH ŽIVALIH:

- Po odstranjevanje rogov
- Kastracijske rane
- Kirurške rane
- Majhne ureznine in odrgnine



UPORABA PRI MALIH ŽIVALIH:

- Majhne ureznine in odrgnine
- Kirurške rane



ANIMEDAZON

Antibiotično "modro" pršilo s klortetraciklinom. Animedazon Spray učinkovito zdravi površinske okužbe kože in parkljev, vključno s travmatskimi ali kirurškimi ranami.

Sestava: Klortetraciklinijev klorid 2,45 % m/m

Klasifikacija: POM-V
Velikost: 211 ml



UPORABA PRI VELIKIH ŽIVALIH

- Površinske okužbe kože in parkljev
- Površinske rane
- Kirurške rane
- Interdigitalni dermatitis (foot rot)
- Digitalni dermatitis



ZINC OXIDE SPRAY

Pršilo, ki tvori bariero za zaščito kože pred morebitnimi dražljivimi snovmi, kot sta znoj ali urin. Nanos pršila pred povijanjem lahko pomaga preprečiti sprijemanje rane s povojem in ščiti kožo ter olajša kasnejše odstranjevanje povoja.

Sestava: Cinkov oksid 20 %, lanolin 5 %, alantoin 0,1 %.

Klasifikacija: GSL
Velikost: 200 ml



UPORABA PRI KONJIH:

- Zaščita kože pred izcedki iz ran, urinom, znojem,...
- Zaščita kože pri namestitvi drenaže in povojev
- Za lažjem odstranjevanje povojev
- Preležanine



UPORABA PRI VELIKIH ŽIVALIH:

- Zaščita kože pred izcedki iz ran, urinom, znojem,...
- Zaščita kože pod povojem
- Izpuščaj na vimenu



UPORABA PRI MALIH ŽIVALIH:

- Zaščita kože pred izcedki iz ran, urinom, znojem,...
- Za lažje odstranjevanje povojev
- Zaščita kože pri namestitvi drenaže in povojev
- Hot spot - akutni vlažni dermatitis
- Preležanine

